

Les ténébrions

Les ténébrions sont des **coléoptères**, c'est-à-dire que ce sont ces **insectes** dont une paire d'ailes est transformée en étuis pour de protéger l'autre paire d'ailes qui leur sert à voler (comme chez les coccinelles, les scarabées, les charançons).


Ce coléoptère a longtemps vécu dans nos **boulangeries** ! En effet, les larves, ou "vers", mangent de la farine ou du son.

Ces insectes ont le même développement que les papillons, c'est-à-dire que **les larves ne ressemblent pas aux adultes** et passent par une **métamorphose** complète de leur corps pour devenir des adultes. Ce stade s'appelle la **nymphe** chez les coléoptères.

La larve est utilisée comme appât par les **pêcheurs** et on peut donc s'en procurer dans les magasins d'articles de pêche.



À l'état de larve, comme à l'état adulte, le ténébrion se nourrit surtout de **déchets végétaux en voie de décomposition**, mais il peut aussi manger des insectes morts, de la viande, des fruits séchés, etc. En élevage, on le nourrit de farine et de son. En cas de manque de nourriture, il peut devenir **cannibale**.



Les œufs éclosent 10 jours après la ponte. Il en sort une **larve** d'environ 2 mm de long de couleur blanchâtre (ver de farine). La durée de la vie de la larve varie de 10 semaines à 15 semaines en élevage.

La croissance est discontinue, c'est-à-dire qu'elle se fait uniquement au moment des **mues**, **quand la larve se débarrasse de sa carapace**. Les larves subissent 10 à 16 mues avant de se transformer en **nymphe** et on trouve au fond du vivarium les dépouilles des anciennes carapaces.

La nymphe dure une vingtaine de jours au cours desquels sont créés les organes de l'adulte. Elle se termine par la mue au cours de laquelle éclot l'adulte, appelé **"imago"**. L'insecte adulte est d'abord blanchâtre et mou. Sa carapace va rapidement durcir et devenir noire.

